

KULLANILACAK İBİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Domates (Sera)	Domates güvesi (Tuta absoluta)	30 ml/100 l su	1 gün
Bağ*	Salkım güvesi (Lobesia botrana)	30 ml/100 l su	14 gün
Biber (Sera)	Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	30 ml/100 l su	1 gün
Pamuk	Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	30 ml/da	21 gün
Hiyar (Sera)	Pamuk yaprak kurdü (Spodoptera littoralis)	30 ml/100 l su	1 gün
Kornişon (Sera)	Pamuk yaprak kurdü (Spodoptera littoralis)	30 ml/100 l su	1 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapla bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Sera Domateste Domates güvesi (Tuta absoluta) ilaçlama normu genel bir referans olarak 50 – 100 L/da olmalıdır.

ilaçlama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu 28 İnsektisit (Böcek ilacı)

222 g/L Flubendiamide

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanılmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulamış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkilere neden olabilir.

Göz ile teması Ciddi göz tahrişine yol açar. Deri ile teması Hafif tahrişe neden olabilir. Solunması halinde oluşacak etkiler belirlenmemiştir. Yutulması halinde zararlı olabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi etkiler gözlenebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazedeye baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



21 Nisan 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



ZARARLILIK İŞARETİ

UYARI KELİMESİ
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.
- P391 Döküntüleri toplayın.
- P501 İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara buluşturmayınız.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanırsa fitotoksik değildir.
- Kullanılmayan ilaç ambalajı içerisinde ağız sıkıca kapalı olarak, kilit altında çocukların erişemeyeceği bir yerde yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzakta saklayınız.
- Boş ilaç ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Dikkat: Kullanmadan önce çalkalayınız.

Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ
S OCAK V.D.: 1601830100
i. Sic. No. 39714 Mersis No. 016018301000001
Kur. Mh. Tekel Cd. Kızı Is Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No 402 Seyhan/ ADANA

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu 28 İnsektisit (Böcek ilacı)

222 g/L Flubendiamide

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Sera Domatese domates güvesine karşı ergin çıkışı sepiyi saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeyse çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 biki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 biktiden 3'ü bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra biktiller tekrar kontrol edilir. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir.

Bağda bağ salkı güvesine karşı uygulamalar tahmin uyan sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde devam etmelidir. Etkili sıcaklıklar toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Sera Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 biki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 biktiden 5'1 bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı rasgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm biktiller kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Sera Hiyarda ve kormişonda pamuk yaprakurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 biki 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılımından yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına ozen gösterilmelidir.

DIRENC İLE İLGİLİ BİLGİ

Asenom® adlı biki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip biki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Asenom® un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 hariç) biki koruma ürünlerinin kullanılmasına ozen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer biki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

Solumun: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeği temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes almıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

Çilt teması: Ayakkabı ve giysileri derhal çıkartın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Çiltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

Göz teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma: Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solumun yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Ergün GÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ
5 OCAK V.D.: 1601830100
i. Sic. No: 83714 Mersis No: 0160183010000001
nur Mh. Tekel Cd. Kızılsu Merkezli A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 407 Seyhan/ ADANA

21 Nisan 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.