



**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD. ŞTİ.

Net Miktarı: 1 L e  
Azami Perakende Satış Fiyatı:  
**İÇİNDEKİLER**  
Captan

**KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	150 g/100 L su	14 gün
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	150 g / 100 L su	14 gün
Erik	Cep hastalığı ( <i>Taphirina pruni</i> )	300 g / 100 L su	14 gün
Şeftali Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek manolyası ( <i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i> )	300 g / 100 L su	14 gün
Kiraz, Vişne	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek manolyası ( <i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i> )	300 g / 100 L su	14 gün
Şeftali Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak deleni ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	300 g / 100 L su	14 gün
Turunçgiller	Turunçgii Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamlanması ( <i>Phytophthora citrophthora</i> )	300 g / 100 L su (Meyve enteksiyonları)	28 gün
Yeni Dünya	Kara leke ( <i>Venturia inaequalis</i> var. <i>erobotryae</i> )	300 g / 100 L su	14 gün
Bağ**	Ölükol ( <i>Phomopsis viticola</i> )	250 g / 100 L su (Yaz Uygulaması)	28 gün
	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	300 g / 100 L su	28 gün

**WP (Islanabilir Toz)**

Grubu	M4	Fungisit (Mantar ilacı)

**%50 Captan**

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkiler neden olabilir.

**İLK YARDIMI ÖNEMLERİ**

**Solunma**, Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

**Yutma**, Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağzını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. **ZEHİR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimi arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**



**17 Mart 2025**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

**ZARARLILIK İŞARETİ**



**UYARI KELİMESİ**

Tehlike

**ZARARLILIK İFADELERİ (H)**

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H331 Solunması halinde toksiktir.
- H351 Kansere yol açma şüphesi var.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P308+P313 Maruz kalmına veya etkileşime halinde ise tıbbi yardıma/bakım alın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardıma/bakım alın.
- P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bekleme sürelerine uyunuz.
- Rüzgarlı havalarda uygulamaya yapmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.

**Ergün CÖNGER**  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ  
5 OCAK V.D. 1601830100  
İ.İ.C. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001  
İnönü Mh. Tekel Cd. Kıza Is Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADA NA

**WP (Islanabilir Toz)**

<b>Grubu</b>	<b>M4</b>	<b>Fungisit (Mantar ilacı)</b>
--------------	-----------	------------------------------------

**%50 Captan**

Sebze Fideleri**	Kök Çürüklüğü (Çökerten) ( <i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i> )	200-250 g/100L su	28 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Yaprak Küfü ( <i>Cladosporium fulvum</i> ) Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	300 g /100 L su 250 g / 100 L su	14 gün 14 gün
Marul	Mildiyö ( <i>Bremia lactucae</i> )	300 g /100 L su	28 gün
Soğan	Mildiyö ( <i>Peronospora destructor</i> )	300 g /100 L su	28 gün
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	350 g /100 L su	28 gün
Karanfil	Pas ( <i>Uromyces caryophyllus</i> )	250 g /100 L su	14 gün
Tütün (Fidelik)	Çökerten ( <i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> )	200 g /100 L su	28 gün

\*\*Yaz uygulamasında kullanılır.

\*\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamaz.

\*\*\*Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalığın yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Armut Karaleke (*Venturia pirina*) de ilaç normu genel referans olarak 25 – 150 L / da olmalıdır.

**Uygulama Makinesinin Temizliği**  
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

17 Mart 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

**ÜRETİM YERİ**

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Doğemealtı / Antalya  
Tel: 0242. 502 27 07

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Beriker Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402 Seyhan /Adana,  
Tel: 03225049132

**Cilt teması,** Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

**Göz teması,** Maruz kalan gözü, göz kapakları açık şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**Ergün CÖNGER**  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ  
5. OCAK V.D.: 1601830100

İc. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001  
Onur Mah. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA



**WP (Islanabilir Toz)**

<b>Grubu</b>	<b>M4</b>	<b>Fungisit (Mantar ilacı)</b>
--------------	-----------	------------------------------------

**%50 Captan**

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**

**Armut Karalekesi:**

- 1.uygulama: Dal sıracası yok ise
- 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında,
- 2.uygulama: beyaz rozet döneminde
- 3.uygulama: Çiçek taç yaprakların % 70-80'i döktükten sonra,
- 4.ve diğer uygulamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

**Elma Karalekesi:**

- 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce yapılır)
- 2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktükten sonra,
- 4.ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

**Eriklerde Cep Hastalığı:**

- 1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,
- 2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döktüğü dönemde yapılmalıdır.

**Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek moniyası (Şeftali, Kiraz, Vişne):**

- 1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
- 2.uygulama: Tam Çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Şeftali yaprak delen (Çit):**

- 1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
- 2.uygulama: ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce ( pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

**Kayısıda yaprak delen:**

- 1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
- 2.uygulama: ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce ( pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
- 3.uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

**Turuçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması:**

- 1.uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
- 2.uygulama: Havalarda yağışlı giderse 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır

**Gövde ve kökboğazi enfeksiyonlarına karşı:**

- 1.uygulama: Gövde ve kökboğazi enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 metre yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır

**Yeni düyya Karalekesi:**

- 1.uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,
- 2.uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,
- 3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döktükten sonra,
- 4.ve diğer uygulamalar: 3.uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, 10 gün aralıyla yapılmalıdır

**Bağ ölükol:**

- 1.uygulama: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce,
- 2.uygulama: Yaz Uygulaması:

**1.uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda**

**2.uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda**

**3.uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.**

**Ergün CÖNGER**  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ  
5. OCAK Y.D. : 1601830100

İt. Sic. No: 93714, Mersis No: 0160183010000001  
Dnür Mh. Tekel Cd. Kızıls. Merkezli A1 Blok  
No: 1 İc. Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA



**17 Mart 2025**

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KABUL EDİLMİŞTİR.**

**WP (Islanabilir Toz)**

<b>Grubu</b>	<b>M4</b>	<b>Fungisit (Mantar ilacı)</b>
--------------	-----------	------------------------------------

**%50 Captan**

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**Bağ Milidiyö:**

1. ilaçlamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. 2. ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

**Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ve Çökerten:**

Fidelikte hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile uygulama yapılır.

**Domates mildiyö:** İlaçlı mücadele çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kü gibi örtünün görünmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

**Domates yaprak kütü:** Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala uygulama kesilmelidir.

**Marul Mildiyö:** Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralıklarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı, birer hafta aralıklarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte uygulama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

**Soğan Mildiyö:** Günlük ortalama sıcaklığın 16 °C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerektirir de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

**Patates Mildiyö:** Hastalığın çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya % 50 Captan çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

**Karanfil Pasi:** Çelikler sıraya geçirilmeden önce uygulamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile uygulamalar yapılmalıdır.

**Sebzelerde Kurşuni Küf (Domates):** Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bükükler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

**Tütün Çökerten (Fidelerde):** Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde uygulamaya başlanır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Beascas® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Beascas® in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

® BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

*(Handwritten signature)*

**17 Mart 2025**

**TARIM VE ÇEVRE BAKANLIĞI**  
**GIDA VE KÖRÜK ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KABUL EDİLMİŞTİR.**

*(Handwritten signature)*  
**Ergün CONGER**  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5 OCAK V.D. : 1601830100  
Tic. Sic. No: 93714, Mersis No: 0160183010000001  
Znür Mh. Tekel Cd. Kızıls Is Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

