

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.09.2025 / 13788

**BEASCROP**  
Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

**Beasimus®**

Yağda Dağılabilen (OD)

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
MISIR	İmampamuğu ( <i>Abutilon theophrasti</i> ) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Tarla Sarmasığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Benekli Darıcan ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Yabani Bamyı ( <i>Hibiscus trionum</i> ) Semiz Otu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Yapışkan Ot ( <i>Setaria verticillata</i> ) Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> ) Zincir Pitreği ( <i>Xanthium spinosum</i> )	200 mL da Çıkış sonrası yabancılardan 2-6 aylık dönemde	

Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması önerilmez. Tatlı mısır ve patlatmalık mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hazırlanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALIBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**Uygulama Makinesinin Temizliği**  
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Beasimus® mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili bir bitki koruma üründür.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

09 Eylül 2025

*[Signature]*

Net Miktarı: 1 L e  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER**

Mesotrione, Nicosulfuron  
**ZARARLILIK İŞARETİ**



#### UYARI KELİMESİ

Dikkat

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNEMLİ İFADELERİ (P)

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P391 Döküntüleri toplayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşınma söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313 Göz tahrişine kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı, yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanılmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmamızdır.
- Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, Fırça ile temizleyiniz.
- Uygulama esnasında bitki koruma ürününün bitişikteki ürünlere sürülmemesine dikkat ediniz. İlaçlı yerde hayvan otlatmamızdır, ot almayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ULUSAL ZEHIR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

09 Eylül 2025

*[Signature]*

Net Miktarı: 1 L e

Azami Perakende Satış Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER**

Mesotrione, Nicosulfuron  
**ZARARLILIK İŞARETİ**



#### UYARI KELİMESİ

Dikkat

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNEMLİ İFADELERİ (P)

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P391 Döküntüleri toplayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşınma söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313 Göz tahrişine kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı, yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanılmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmamızdır.
- Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, Fırça ile temizleyiniz.
- Uygulama esnasında bitki koruma ürününün bitişikteki ürünlere sürülmemesine dikkat ediniz. İlaçlı yerde hayvan otlatmamızdır, ot almayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**Ergün CÖNGER**  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5 OCAK V.D.: 1601830100  
Öncü Mh., Tekel Cd. Kızı İS Merkezi AT Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

Beasimus® esas itibarıyla sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur, ilacın etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotenoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzimi sentezi inhibitördür. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine'in yapımında ihtiyaç vardır.

Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Çıktış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kutikula oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir. Ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Uygulamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için, dekara 20-40 L su, yelpaze huzmeli meme ile iyi bir kaplama uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

**BITKİ TOLERANSI:** Beasimus® sadece mısırdaki kullanılan mısır tarafından iyi tolere edilir.

**DİKKAT:**

-Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

-Beasimus® organik fosforlu bir toprak ilacının kullandığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea'li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle arışı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.

**MUNAVEBE VE TEKRAR EKİM:** Herhangi bir nedenle mısır çıktışı olmaz ise, hemen tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kişlik buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

**DİKKAT:** Şekerpancarı, bezelye, bakla ekimi Beasimus® uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve bezeler ekilmez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken uygulama yapılmamalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ**

Beasimus® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2.27 ve B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlardan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Beasimus® un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlannması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2.27 ve B2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilemez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

09 Eylül 2025

*(Handwritten signature)*



**Beasimus®**

**Yağda Dağılabilen (OD)**

<b>Grubu</b>	<b>F2:27</b>	<b>B2</b>	<b>Herbisit</b>
			<b>(Yabancı ot ilacı)</b>

**75 g /L Mesotrione + 30 g/L Nicosulfuron**

**Cilt ile temas:** Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

**Göz Teması:** Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

**Yutma:** Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**



**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrollümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

**ÜRETİM YERİ**

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM,  
Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya  
Tel: 0242 502 27 07

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Beriker  
Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402  
Seyhan /Adana,  
Tel: 0322 504 91 32

*(Handwritten signature)*  
**Ergün CÖNGER**  
Ruhsatlandırma Müdürü

**BEASCROP**  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5. OCAK V.D. - 1601830100  
Tic. Sic. No: 93714/Mersis No: 0160183010000001  
Onur Mah. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok  
No: 1 İc Kapı No 407 Seyhan/ ADANA