

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

Ruhsat Tarih ve Numarası: 30.09.2025 / 13841

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Buğday	Tahıl küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i>)	100 ml/da	35 gün
	Septoriya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	100 ml/da	35 gün
	Kahverengi pas (<i>Puccinia recondita tritici</i>)	100 ml/da	35 gün
	Buğdayda başak yanıklığı (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>Fusarium araminearum</i>)	100 ml/da	35 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Buğday Tahıl küllemesi (*Erysiphe graminis*) ilaçlama normu genel bir referans olarak 5 – 15 L/da olmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamanızı sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

"Beastone® hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

Buğdayda tahıl küllemesine karşı: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyrini izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın, hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğdayda kahverengi pas karşı: Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü yerlerde ilk püstülleri görülmeye başlayınca ilk uygulama yapılır. Hastalığın şiddetine göre ilk ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılabilir.



Beastone®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	G1:3	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	-------------------------

175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecikleri solunmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4 üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkilere neden olabilir. Göz ile teması Ciddi göz tahrişine yol açar. Deri ile teması Hafif tahrişe neden olabilir. Solunması halinde oluşacak etkiler belirlenmemiştir. Yutulması halinde zararlı olabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi etkiler gözlenebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazedeye baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

ULUSAL ZEHIR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Prothioconazole: Trifloxystrobin
ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
- P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardıma/ müdahale alın.
- P391 Döküntüleri toplayınız
- P501 İçeriği/ kabı yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününü ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
- Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.

Dikkat: Bitki koruma ürününü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Ergün ÇÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü



TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
S. OCAK V.D.: 1601830100
Tic. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
Çnur Mh, Tekel Cd. Kızıls Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

30 Eylül 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

[Signature]



Buğdayda septorya yaprak lekeseine karşı: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kin döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru trımanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıkça ve başaklanma döneminde yağışlı havalara devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir.

Buğdayda başak yamıklığına karşı: Buğday bitkilerinin çiçeklenme devresinde ortasında bir ilaçlama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Beastone® adlı bitki koruma ürünü, eiki mekanizmasına göre Grup G1:3 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı eiki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Beastone® in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı eiki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 ve C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402
Seyhan /Adana,
Tel: 0322 504 91 32

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	G1:3	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	------	-------	----------------------------

175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin

Solunum: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

Cilt teması: Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

Göz teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma: Kusturmayın, ağız içeri su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



30 Eylül 2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.