

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Sıra No:
Ruhsat Tarih ve Numarası:



Challerox®

Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Ayçiçeği (Çıkış öncesi)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken-iştir (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuşotu=Serçe dişi (<i>Stellaria media</i>) Adi Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)	Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da Darıcan otuna: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Ayçiçeği (Çıkış sonrası)	Sirken-iştir (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde	49 gün
Havuş	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken-iştir (<i>Chenopodium album</i>) Yabani semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yeşil kirpi dani (<i>Setaria viridis</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	150 ml/da Havuş ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Aclonifen

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ
Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H351 Kansere yol açma şüphesi var.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye veriminden kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P302+352 Cilt ile temas halinde bol sabun ve su ile yıkayın.
- P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P501 İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanılmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak tutunuz.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

DİKKAT: KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	F3:13	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
--------------	--------------	------------------------------------

600 g/l Aclonifen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

- Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açkık bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.
- Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.
- Yutma:** Ağzı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez ve kusturulmaz. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Solutma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Nisan 2025

(İmza)

(İmza)



(İmza)

Ergün ÇÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü



ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Nohut	Sirken-iştir (<i>Chenopodium album</i>) Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>) Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Küçük turp (<i>Rapistrum rugosum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkiş sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
Mercimek (Çıkiş öncesi)	Dikenli yabancı marul (<i>Lactuca serriola</i>)	75 ml/da Çıkiş sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
Mercimek (Çıkiş sonrası)	Gönüli hardal (<i>Myagrimum perfoliatum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	300 ml/da 250 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Mercimek (Çıkiş sonrası)	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Gönüli hardal (<i>Myagrimum perfoliatum</i>) Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	125 ml/da Çıkiş sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde 150 ml/da Çıkiş sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM,
Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah.
Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402

Seyhan /Adana.

Tel: 0322 504 91 32

Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D.: 1601830100
Tic. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
Onur Mh. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 407 Seyhan / ADANA

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Nisan 2025

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ
Challerox® yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, San-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanılmadan önce firmaya danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
Challerox® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3:13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Challerox®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3:13 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Nisan 2025



BEASCROP
Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

Challerox®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu F3:13 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

600 g/l Aclonifen

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114


Ergün CÖNGÖR
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D.: 1601830100
Tic. Sic. No: 93714 Mersis No: 01601830100000001
Dnür Mh. Tekel Cd. Kızıls Merkezi A1 Blok
No: 11c Kabi No: 402 Seyhan/ ADAANA


Dr. Nesrin ÇAKIR-ARICAN
Daire Başkanı

