

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası:



Corbeas®

Emülsiyon Konsantr (EC)

Grubu	3A	İnsektisit (Böcek ilacı)
--------------	-----------	-------------------------------------

KULLANILACAK İBİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Yeşilkurt* (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da (Larva)	7 gün
	Pamuk yaprakpiresi (<i>Empoasca decipiens</i>)	7.5 ml/da (Nimf, Ergin)	
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da (Larva)	7 gün
Elma	Elma içkürdü (<i>Cydia pomonella</i>)	5 ml/100 L su	7 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı psilidi (<i>Agonosceana pistaciae</i>)	20 ml/100 L su (Nimf)	21 gün
Findik	Findik kurdü (<i>Curculio nucum</i>)	20 ml/da (Larva, Ergin)	14 gün
Bağ**	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	7.5 ml/100 L su (Larva)	14 gün
Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	30 ml/da (Larva)	21 gün
	Mısır Kurdü (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	15 gün ara ile 3 uygulama)	

* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılamaz.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İBİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASİYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Pamuk Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*) da ilaç normu genel referans olarak 20 – 35 L/7 da olmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Esfenvalerate

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H331 Solunması halinde toksiktir.
- H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H400 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P272 Kirlenmiş kıyafetleri iş yeri dışına çıkarmayın.
- P273 Çevreye verimmesinden kaçının.
- P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
- P304+P341 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P391 Döküntüleri toplayın.
- P501 İçerdiği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.
- EUH 208 Esfenvalerate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



05 Mart 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ
5 OCAK V.D. : 1601830100
c. Sic No: 93714, Mersis No: 0160183010000001
İstanbul, Tekel Cd. Kızı İş Merkezi A1 Blok
No: 11 Kat: No: 402 Seyhan/ ADANA

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	3A	Insektisit (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

200 g/L Esfenvalerate

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Pamukta Yeşilçukurt: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilçukurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta yaprakpıresi: Rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan birer adet olamak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprak piresi saptandığında uygulamaya yapılır.

Domateste Yeşilçukurt: Tariya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 51 bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elmada Elma İçkürdü: Elma içkürdüne karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kürdü mütadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Antepfıstığında Psilid: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumaajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Fındıkta Fındık kurdü: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2 den fazla fındık kurdü görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağda Salkım güvesi: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar 1. Döle 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Döle 520 gün-derece, 3. Döle 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Döle çiçek tomurcuğu, 2. Döle koruk, 3. Döle tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İla larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Mısırdaki Mısır Kurdü ve Mısır Koçankurdü: İla yumurta tespit edildiğinde uygulamaya yapılır. İla uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Corbeas® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarıyla uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Corbeas® in aynı üretim sezonunda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

05 Mart 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanılmayınız.
• Balıklara zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

- Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Ürünü mahallülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dondan koruyunuz.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM,
Mahalle 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242. 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Berker
Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402
Seyhan /Adana,
Tel: 03225049132

(Signature)

Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ
5 OCAK V.D.: 1501830100
i.c. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
İnirur Mah. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
No: 11c Kapı No: 402 Seyhan/ADANA

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



(Handwritten initials)