

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.08.2025/13716

#### KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	40 g/100 L su	14 gün
Bağ*	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıkcılığı ( <i>Taphrina deformans</i> )	100 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Çiçek monilyası ( <i>Sclerotinia laxa=Monilinia laxa</i> )	50 g/100 L su	14 gün
Turunçgiller	Kahverengi leke ( <i>Alternaria alternata f.sp. citri</i> )	75 g/100 L su	14 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Mantar sporlarının çimlenmesini önleyerek etkileyen, koruyucu özellikte bir fungusittir. İlaçlamadan sonra bitki üzerinde bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolayca yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktarıyla iyice karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Elma Karaleke (*Venturia inaequalis*) ilaçlama normu genel bir referans olarak bodur çeşitler için 25-50 L/da, yarı bodur çeşitler için 25-100 L/da ve yüksek çeşitler için 25- 150 L/da olmalıdır.

#### İlaçlama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



## Cropexa®

### Suda dağılılabilen granül (WG)

Grubu M9 Fungisit (Mantar ilacı)

%70 Dithianon

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkilere neden olabilir.

**Göz ile teması,** Ciddi göz tahrişine yol açar

**Deri ile teması,** Hafif tahrişe neden olabilir.

**Solunması,** Solunması halinde oluşacak etkiler belirlenmemiştir.

**Yutulması,** Yutulması halinde zararlı olabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi etkiler gözlenebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:  
İÇİNDEKİLER  
Dithianon

#### ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ  
Dikkat

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H410 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi bol su ile iyice yıkayınız.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.  
P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/maske kullanınız.  
P391 Döküntüyü bir araya toplayınız.  
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitkinin her tarafının iyice ıslanmasını sağlayacak şekilde yeterli suyla kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

06 Ağustos 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



İrgün CÖNGER  
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5 OCAK V.D.: 1601830100  
c. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001  
Nispetiye Mh. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

"Cropexa® hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

### Elma Karalekesi:

1. **Uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. **Uygulama:** Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. **Uygulama:** Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce
4. **ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 7 - 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

### Bağ Mildiyözü:

1. **Uygulama:** Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. **ve diğer uygulamalar:** İlk uygulanmadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çığ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

### Şeftali Yaprak Kıvrıkcılığı:

1. **Uygulama:** Sonbaharda yapraklar %80 döküldükten sonra,
2. **Uygulama:** İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

### Kayısı çiçek monilyası

1. **Uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (Çiçeklerin %5-10'u açtığında)
  2. **Uygulama:** Tam çiçeklenmede (Çiçeklerin %90-100'ü açtığında) yapılır.
- Turuncgillerde kahverengi leke:** Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Cropexa® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cropexa®'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

06 Ağustos 2025

06 Ağustos 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



## Cropexa® Suda dağılılabilen granül (WG)

Grubu	M9	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	----	-------------------------

%70 Dithianon

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeysin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazede baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

**Solumum;** Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

**Cilt teması;** Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

**Göz teması;** Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

**Yutma;** Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solumum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

## DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulamanın kontrolümüz dışında olması nedeniyle, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından kaynaklanabilecek zararlardan sorumluluk kabul edilmez.

## ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Antalya  
Organize Sanayi Bölgesi 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15  
Döşemealtı / Antalya  
Tel: 0242 502 27 07

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Tekel  
Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402  
Seyhan /Adana,  
Tel: 0322 504 91 32

  
Ergün ÇONGER  
Ruhsatlandırma Müdürü

  
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ  
5 OCAK V.D.: 1501830100

Tic. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001  
Onur Mh. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok  
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA