

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 06.08.2025/13721

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Domates (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Patlıcan (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Hiyar (Sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Kornişon (Sera)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Marul (Tarla)	Sebzelerde beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	100 ml/da	3 gün
Soğan Sarımsak	Soğan Pasi (<i>Puccinia porri</i>)	100 ml/da	7 gün
Çilek	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/da	3 gün
	Çilek külemesi (<i>Sphaerotheca macularis</i> f.sp. <i>fragariae</i>)		
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 ml/100 L su	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda/yağın hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırmaya işleme devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Sera Domatese Kurşuni küf (*Botrytis cinerea*) ilaçlama normu genel bir referans olarak 50 – 100 L/da olmalıdır.



Entush®

Süspansiyon Konsantré (SC)

Grubu D1:9 C2:7 FUNGISİT (Mantar ilacı)

375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkilere neden olabilir.

Göz ile teması Ciddi göz tahrişine yol açar. Deri ile teması Hafif tahriş neden olabilir. Solunması halinde oluşacak etkiler belirlenmemiştir. Yutulması halinde zararlı olabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi etkiler gözlenebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazedeye baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Pyrimethanil ve Fluopyram

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
- P391 Döküntüleri toplayınız.
- P501 İçerdiği/kabı, yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Airlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajlarında kapalı olarak, kuru ve serin yerde saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

Ergün CÖNGER
Rühsatlandırma Müdürü



BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D. : 1601830100
İ.İ. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
Nur Mh, Tekel Cd. Kıza İş Merkezi AT Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ADANA

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

"Entush® hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

Domates (Sera), Biber (Sera) ve Patlıcan (Sera) kurşunu küf: Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Domates ürününde bir (maksimum iki) uygulama yapılması önerilir.

Hıyar (Sera), Kornişon (Sera) ve Marul (Tarla) beyaz çürüklük: Kimyasal mücadele toprak ilaçlaması veya yeşil aksam ilaçlaması halinde yapılabilir. Toprak ilaçlaması: İlaçların etiketinde belirtildiği şekilde ekim veya dikimden önce uygulanır. Yeşil aksam ilaçlaması: Hastalığın ilk belirtilerinin görüldüğünde başlanılır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir.

*Domates, biber, patlıcan, hıyar ve kornişon ürünlerinde bir (maksimum iki) uygulama önerilir.

Soğan, Sarımsak pas hastalığı: Uygulama yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas pustülleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün arayla uygulamaya devam edilmelidir. Aynı sezon içerisinde maksimum iki uygulama önerilmektedir.

Çilekte kurşunu küf: Birinci uygulama ilk çiçeklerin %10'unun açtığı dönemde yapılır. İkinci uygulama çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde yapılır. Üçüncü uygulama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

Çilekte küllerme: Birinci uygulama ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. İkinci uygulama kullanımlan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara devam edilir.

Uygulama programlarında son uygulamaya ila hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. Çilek bitkinde iki (maksimum üç) uygulama yapılması önerilir.

Elma karalekesi: Birinci uygulama çiçek gözleri kabadığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) yapılır. İkinci uygulama pembe çiçek tomurcuğu devresinde (çiçekler kısa saplan ile ayrı görülünce) yapılır. Üçüncü uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Entush® adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 ve C2:7 olarak sınıflandırılmış bir fungistiftir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Entush®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 ve C2:7 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIYABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

06 Ağustos 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



BEASCROP
Tarım Çözümleri Ltd. Şti.

Entush®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu D1:9 C2:7 FUNGISİT (Mantar ilacı)

375 g/l Pyrimethanil +125 g/l Fluopyram

Solunum: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

Cilt teması: Ayakkabı ve giysileri derhal çıkartın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Cilfte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın.

Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmesi olduğundan emin olun, ya da atın.

Göz teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamay sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma: Kusturmayın, ağız içeri su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. **ZEHIR MERKEZİNİ** veya doktoru/hekimini arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHIR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.



ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FIRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402
Seyhan /Adana,
Tel: 0322 504 91 3232

Ergün ÇÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED SİRKETİ

5 OCAK V.D.: 1601830100
Tic. Sic. No: 93714, Mersis No: 0160183010000001
Onur Mah. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA