

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şart No:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

KULLANILACĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	40 g/100 L su	3 gün
Kornişon (Sera)	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	40 g/100 L su	3 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	40 g/100 L su (Sera) 40 g/da (Tarla)	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	40 g/100 L su (Sera) 40 g/da (Tarla)	3 gün
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	40 g/100 L su	28 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	40 g/da	14 gün
Karpuz	Alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	40 g/da	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Sera Hiyarında Kabakgillerde mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis*) ilaçlama normu genel bir referans olarak 50-100 L/da olmalıdır.



Fiction®

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu 27 C3:11 FUNGİSİT (Mantar ilacı)

%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrlerini solumayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mukozada tahriş, abdominal ağrı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, mental değişikliklere, karaciğerde ters etkilere neden olabilir. Göz ile teması Ciddi göz tahrişine yol açar. Deri ile teması Hafif tahrişe neden olabilir. Solunması halinde oluşacak etkiler belirlenmemiştir. Yutulması halinde zararı olabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi etkiler gözlenebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Uyarılar: Maruziyet durumunda belirtilerin gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazede baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



16 Haziran 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Cymoxanil ve Famoxadone

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302 Yutulması halinde zararıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
H372 Uzun süreli veya tekrarlı manuz kalma sonucu organlarda hasara yol açar
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P264 Elleçlemeden sonra sabun ve su ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P330 Ağzınızı çalkalayın.
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız..
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5 OCAK V.D.: 1601830100
ic. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
İnür Mh, Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 407 Seyhan/ADANA



Fiction®

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	27	C3:11	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	-------	-------------------------

%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

"Fiction® hakkında bir şikayetiniz olması halinde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

Hiyar, Kornişon- Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanılır. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Fiction® ile bir üretim sezonunda üçten fazla uygulama yapmayınız.

Domates- Mildiyö: İlaçlı mucedeleyle çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gıbi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanılır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Fiction® ile bir üretim sezonunda üçten fazla uygulama yapmayınız.

Domates -Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelette gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Fiction® ile bir üretim sezonunda üçten fazla uygulama yapmayınız.

Bağ -Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır. Fiction® ile bir üretim sezonunda üçten fazla uygulama yapmayınız.

Patates- Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanılır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır. Fiction® ile bir üretim sezonunda üçten fazla uygulama yapmayınız.

Karpuz- Alternarya Yaprak Yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanılır.

Fiction® ile bir üretim sezonunda üçten fazla uygulama yapmayınız. Fiction® uygulamadan sonra 2 saat sonra yağın yağmurlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlama gerektirmez. Eğer uygulamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse bitki koruma ürününün etkisinde azalma olacağından uygulamayı tekrarlamak gerekir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Fiction® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Fiction® in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 27 ve C3:11 hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, doza ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz.

ÜRÜTİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Beriker Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402 Seyhan /Adana.
Tel: 0322 504 91 32


Ergün CÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü


BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ

5 OCAK Y.D.: 1601830100
Tic. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
Onur Mh, Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA

Solunum: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

Göz Teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma: Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağız yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağızını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

