

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu G2:5 G1:3 Fungisit (Mantar ilacı)

300 g/l Spiroxamine + 160 g/l Prothioconazole

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanılmamıştır.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Maruziyet durumunda belirtilen gelişmesini beklemeyin. Hastayı maruziyet alanından hemen uzaklaştırın. Bu ürünün Güvenlik Bilgi Formunu ya da ürünün kutusunu göstererek derhal tıbbi yardım isteyiniz. Uygun koruyucu kıyafetleri giyin. Eğer kazazede baygınsa ağız yolu ile sıvı vermeyin.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solum: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kazazede yi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes alamıyorsa derhal ambulans çağırın ve derhal tıbbi yardım alın.
Cilt teması: Ayakkabı ve giysileri derhal çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol su ve aşındırıcı olmayan bir sabun ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise, tıbbi yardım alın. Giysi ayakkabı ve botların tekrar kullanılmadan önce tamamen temizlenmiş olduğundan emin olun, ya da atın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Tahıl külemesi (<i>Erysiphe graminis</i>) Septoria yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>) Kök ve kökboğazi çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Bipolaris rokiniana</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pseu docer cosporella herpotrichoides</i>)	100 ml/da 100 ml/da 100 ml/da	35 gün 35 gün 35 gün
Arpa	Arpa yaprak yanıklığı (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	100 ml/da	35 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsîye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırın. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurular. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Buğday Tahıl külemesi (*Erysiphe graminis*) de ilaçlama normu genel bir referans olarak 5 - 15 L / da olmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlandıncadan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Buğday tahıl külemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

12 Mayıs 2025

TARIM VE ÇERHAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı: 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Spiroxamine ve Prothioconazole

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir
- H332 Solunması halinde zararlıdır.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P302+352 Cilt ile temas halinde bol su ile yıkayın.
- P363 Kirilenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P391 Döküntüleri toplayın.
- P501 İçerdiği/kabı yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü atıklarını akarsu göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Uygulama esnasında genel korunma tedbirlerine mutlaka uyunuz.

(Handwritten signature)

Ergün ÇÖNGER
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TARIM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5. OCAK V.D.: 1601830100
İc. Sic. No: 93714 Mersis No: 0160183010000001
Dnur Mh., Tekel Cd. Kızı İs. Merkezi A1 Blok
No: 1 İç Kapı No: 402 Seyhan/ ADANA



Sprinex®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu G2:5 G1:3 Fungisit (Mantar ilacı)

300 g/l Spiroxamine + 160 g/l Prothioconazole

Buğday Septorya Yaprak Lekesi: Normal koşullarda ekonomik olmamakla beraber, eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılabilir. Kardeşlenme başlangıcından itibaren yağışlı havalara uzarsa Septorya zarar artar. Uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı, kin döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Ancak burada da çok geç kalmamak doğrudur. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla buluşıkça ve başaklanma döneminde yağışlı havalara devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulama gerek duyulabilir.

Buğday ve Arpada Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü: Tohumluk ekiminden önce tohum ilaçlaması yapılır. Tohumluğun ilaçlama düzeneği olan selektörlerde ilaçlaması tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan yerlerde ilaçlama bidadonları ile ilaçlama yapılır. İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün tohumun bütün yüzeyini tamamen kaplanmasına özen gösterilmelidir. Yeşil aksam ilaçlaması kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

Arpa Yaprak Yanıklığı: Hastalık etmeninin ilk lekeleri görüldüğünde yapılmalıdır.

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Sprinex® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G2:5 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sprinex®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G2:5 ve G1 :3 haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

© BEASCROP firmasının tescilli markasıdır.

12 Mayıs 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİM YERİ

CLONE KİMYA TARIM SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. AOSB 3. KISIM, Mahallesi 25 Cad. No: 15 Döşemealtı / Antalya
Tel: 0242 502 27 07

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

BEASCROP TARIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ. Onur Mah. Cemal Beriker Bulvarı Tekel Cad. Kıza İş Merkezi A1 blok Kat:4 No:402 Seyhan /Adana,
Tel: 0322 504 91 32


Ergün CÖNGÖR
Ruhsatlandırma Müdürü

BEASCROP
TAHİM ÇÖZÜMLERİ LIMITED ŞİRKETİ
5. OCAK V.D.: 1601830100
Sic No: 93714-Merhis No: 0160183010000001
Kuruluş Mh. Tekel Cd. Kıza İş Merkezi A1 Blok
Konya 11r-Kamı No-407 Seyhan/ ADANA

Göz teması: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarm ve yıkamayı sürdürün. Göz tahrişi kalıcı ise, tıbbi yardım/bakım alın.

Yutma: Kusturmayın, ağız içini su ile yıkayın ve yıkama suyunu dışarı çıkarmasını sağlayın. Ağzı yoluyla asla herhangi bir şey verilmemelidir. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağzını tekrar suyla çalkalayın. Kusma refleksine karşın, solunum yoluna kaçmasını engelleyecek bir pozisyonda tutun. ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın, Derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

